

★各種予防接種について★

予防接種名 (予診票の色) 種類	接種回数	対象者・標準的な接種期間	他の予防接種との 接種間隔																			
<b>ロタウイルス</b> 【1価:ロタリックスノ 5価:ロタテック】 (白色)  生ワクチン	1 価 : 2 回 5 価 : 3 回	<b>【対象者】</b> 1 価 : 生後 6 週 ~ 2 4 週 0 日 5 価 : 生後 6 週 ~ 3 2 週 0 日 <b>【接種期間】</b> 1 価 : 1 回目は生後 6 週後、2 回目は 2 7 日以上の間隔をおいて 生後 2 4 週 0 日までに完了 5 価 : 1 回目は生後 6 週後、2 回目・3 回目は 2 7 日以上の間隔をおいて 生後 3 2 週 0 日までに完了  ※初回接種は生後 1 4 週 6 日までにを行うことが推奨されています。 ※腸重積症の既往のあることが明らかな方、先天性消化管障害を有する 方、重症複合免疫不全症の所見が認められる方は対象外となります。	制限なし																			
<b>小児用 肺炎球菌</b> (みどり)  不活化ワクチン	初回 : 3 回 追加 : 1 回	<b>【対象者】</b> 生後 2 か月 ~ 5 歳に至るまで  <b>【標準的な接種期間】</b> 初回 : 生後 2 か月 ~ 7 か月に至るまでの間に接種を開始し 2 7 日 以上の期間をおいて 3 回接種 ★ 2 回目及び 3 回目の接種は 2 歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合 は行わない (追加接種は可能) ★ 2 回目の接種は 1 歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は 3 回目の 接種は行わない (追加接種は可能)  追加 : 3 回目終了後 6 0 日間以上の間隔をおいて、1 歳に至った日以 降に 1 回接種 (標準的には生後 1 2 か月 ~ 1 5 か月に至るまで の間)  ※接種開始が生後 7 か月以上の場合は以下の通りとなります。	制限なし																			
接種開始時期		初回接種 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px; text-align: center;">1 回目</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">→</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">2 回目</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">→</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">3 回目</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">[ 2 7 日以上の間隔 ]</td> </tr> </table> 追加接種 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px; text-align: center;">1 回目</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">→</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">2 回目</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">60 日以上の間隔をおく</td> </tr> </table>		1 回目	→	2 回目	→	3 回目		[ 2 7 日以上の間隔 ]						1 回目	→	2 回目		60 日以上の間隔をおく		
	1 回目	→	2 回目	→	3 回目																	
	[ 2 7 日以上の間隔 ]																					
	1 回目	→	2 回目																			
	60 日以上の間隔をおく																					
生後 7 か月 ~ 1 歳に至るまで	1 回目 → 2 回目 → 3 回目 [ 2 7 日以上の間隔 ] ★ 2 回目は 2 歳までに接種し、超えた場合は 行わない (追加接種は可能)	初回接種終了後 60 日以上の間隔をおき、1 歳になった翌 日以降に実施 (標準的には 12 ~ 15 か月に至るまで)																				
生後 1 歳 ~ 2 歳 に至るまで	1 回目 → 2 回目	60 日以上の間隔をおく																				
生後 2 歳 ~ 5 歳 に至るまで	1 回																					
<b>B 型肝炎</b> (灰色)  不活化ワクチン	初回 : 2 回 追加 : 1 回	<b>【対象者】</b> 1 歳に至るまで  <b>【標準的な接種期間】</b> 生後 2 か月に至った時 ~ 9 か月に至るまで  初回 : 2 7 日以上の間隔をおいて 2 回接種 追加 : 1 回目の注射から 1 3 9 日以上の間隔をおいて 1 回接種  ※B型肝炎ウイルスに感染した恐れがあり、抗HBs人免疫グロブ リン投与に併せて、組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けた ことがある方は、定期接種の対象外となります。	制限なし																			
<b>五種混合</b> 【ジフテリア 百日せき/破傷風 /不活化ポリオノ ヒブ】 (サーモンピンク)  不活化ワクチン	<b>【1 期】</b> 初回 : 3 回 追加 : 1 回	<b>【対象者】</b> 生後 2 か月 ~ 7 歳 6 か月に至るまで  <b>【標準的な接種期間】</b> 初回 : 生後 2 か月から 7 か月に至るまでに開始し、2 0 日以上 (標準的 には 5 6 日まで) の間隔をおいて 3 回接種 追加 : 3 回目終了後 6 か月 ~ 1 8 か月までの間隔をおいて 1 回接種	制限なし																			

予防接種名 (予診票の色) 種類	接種回数	対象者・標準的な接種期間	他の予防接種との 接種間隔
<b>B C G</b> (水色)  生ワクチン	1 回	<b>【対象者】</b> 生後 1 歳に至るまで  <b>【標準的な接種期間】</b> 生後 5 か月 ~ 8 か月に達するまでの期間に 1 回接種  ※予防接種・外傷等によるケロイドのある方、免疫機能の病気がある 方、結核の既往がある方は接種不可	他の注射生ワクチンを接種する場合は 2 7 日以上おく
<b>麻しん・風疹 しん混合</b> 【MR】 (白茶) 生ワクチン	1 期 : 1 回 2 期 : 1 回	<b>【対象者と回数】</b> 1 期 : 1 歳 ~ 2 歳に至るまでの間に 1 回接種 2 期 : 小学校就学前の 4 月 1 日 ~ 翌年 3 月 3 1 日までの 1 年間に 1 回 接種	他の注射生ワクチンを接種する場合は 2 7 日以上おく
<b>水痘</b> 【水ぼうそう】 (赤色)  生ワクチン	2 回	<b>【対象者と回数】</b> 1 歳 ~ 3 歳に至るまでの間に 3 か月以上の間隔をあけて 2 回接種  <b>【標準的な接種期間】</b> 1 回目 : 1 歳 ~ 1 歳 3 か月に達するまでに 1 回接種 2 回目 : 1 回目の接種後、6 か月 ~ 1 2 か月までの間隔をおいて 1 回 接種  ※すでに水痘にかかったことがある方は定期対象外となります。	他の注射生ワクチンを接種する場合は 2 7 日以上おく
<b>日本脳炎</b> (藤色)  不活化ワクチン	<b>【1 期】</b> 初回 : 2 回 追加 : 1 回	<b>【対象者】</b> 1 歳に至るまで  <b>【標準的な接種期間】</b> 生後 2 か月に至った時 ~ 9 か月に至るまで  初回 : 2 7 日以上の間隔をおいて 2 回接種 追加 : 1 回目の注射から 1 3 9 日以上の間隔をおいて 1 回接種  ※B型肝炎ウイルスに感染した恐れがあり、抗HBs人免疫グロブ リン投与に併せて、組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けた ことがある方は、定期接種の対象外となります。	制限なし

★予防接種スケジュールの例★

種類	ワクチン	乳児期									幼児期						
		2 月 1 歳	3 月 1 歳 3 月	4 月 1 歳 6 月	5 月 1 歳 9 月	6 月 2 歳	7 月 2 歳 3 月	8 月 2 歳 6 月	9 月 2 歳 9 月	1 歳 3 歳	1 歳 6 歳	2 歳 9 歳	3 歳 12 歳	4 歳 15 歳	5 歳 18 歳	6 歳 21 歳	
定期	ロタウイルス	①	②														
	5 価	①	②	③													
	小児用肺炎球菌	①	②	③							④						
	B型肝炎	①	②				③										
	五種混合	①	②	③							④						
	B C G					①											
	麻しん・風しん (MR)										①						②
	水痘 (水ぼうそう)										①	②					
日本脳炎													①	②	③		
任意	おたふくかぜ									①						( ② )	

【年齢の考え方】

「～歳 (か月) に至るまで・未満」とは、～歳 (か月) になる前日までになります。  
 例) 生後 1 歳に至るまで → 1 歳の誕生日の前日まで  
 生後 1 歳 ~ 2 に至るまで → 1 歳の誕生日の前日から 2 歳の誕生日の前日まで  
 生後 7 歳 6 か月に至るまで → 7 歳 6 か月の前日まで